




# Synthèse saison 2013/2014: Pour Bécassiers de France c'est une saison moyenne

## Les grands chiffres pour la saison 2013/2014<sup>1</sup>.

- ICA 3,5 : 1,73
- Poids moyen des oiseaux adultes : 321 g
- Poids moyen des oiseaux jeunes : 310 g
- Ratio jeune adulte : 65%



L'âge ratio est bon, l'ICA est lui en nette progression, il est même excellent. Toutefois il n'est qu'un indicateur local d'abondance. Aujourd'hui en France (sauf sur certains secteurs) le chasseur de bécasse ne sort que quand les oiseaux sont présents sur son territoire. De ce fait les ICA ont une propension à rester élevés de la première quinzaine de décembre à la fermeture fin février. Alors que les données cumulées de temps passé à la chasse, baissent.



<sup>1</sup> Il s'agit d'un moyenne issue de l'ensemble des chiffres tableaux de fin de saison et saisie en ligne  
Données sources BDF ©




## Profil type du chasseur BDF sur l'ensemble du territoire.

- 7,6 bécasses prélevées en moyenne par chasseur.
- 28 bécasses vues en moyenne par chasseur
- Il a chassé en moyenne 57 heures dans l'année
- Il a réalisé 18 sorties de 3,1 heures en moyenne

Il faut noter qu'**historiquement la plupart des adhérents BDF sont dans la partie Sud de la France.** Ceux-ci sont fortement représentatifs des chasseurs de chasse de type ACCA ou communale. Les chasseurs BDF sont directement au contact du flux Oriental dont la nidification est d'origine Russe. Il est à noter que les études du réseau Bécasse et le suivi scientifique de l'espèce sont en très grosse majorité axés sur ce flux. C'est pourquoi nous mettons en évidence dans toutes nos analyses et réflexions les deux flux. **Nous pouvons aussi dire de par notre représentativité et nos travaux, il y a une très bonne corrélation entre les prévisions du Réseau Bécasse et nos observations de terrain qui restent des observations de chasseurs passionnés..**


## Une saison moyenne, pourquoi ? Alors que tout le monde annonce des pluies de bécasses.




Nous observons que pour la saison passée le nombre de bécasses vues et le nombre de bécasses prélevées, reste dans une moyenne basse (la saison 2012/2013 étant une mauvaise saison).

Effectivement les années exceptionnelles, un chasseur BDF prélève **12 bécasses en moyenne par an et en rencontre plus de quarante différentes.** Les années mauvaises il **prélève 5 bécasses et en rencontre moins de 20.** Cette année, nous sommes **7.6 bécasses par chasseur pour 30 différentes vues en moyenne.**

## Une rupture, entre les deux flux, est évidente.




Pour aller plus loin dans l'analyse. En chiffres sur les deux flux nous avons des informations intéressantes. Un ICA à 3.13 au-dessus la ligne alimentée par le flux fenno scandinave et le flux oriental que nous allons appeler le NORD et un ICA à 1.39 pour le flux essentiellement oriental que nous appelons le SUD. Sur le NORD nous avons des ICA très élevés et un taux moyen d'oiseaux prélevés par chasseur assez faible : 19% des bécasses vues sont prélevées. Mais c'est aussi sur ces secteurs où nous avons le plus de chasseurs BDF qui arrivent à plus de 25 oiseaux pas an.









Sur le SUD, l'ICA est très moyen (1,39 toutefois il remonte par rapport à la saison précédente (1,10). Il faut noter que le taux de réussite (ou taux de prélèvement) est lui beaucoup plus élevé sur ces régions, 30% des bécasses vues sont prélevées.

## ICA par région



Cette année du fait des conditions météo la région Rhône Alpes et l’Auvergne n’ont pas bénéficié d’une bonne présence d’oiseaux. Les oiseaux sont descendus très tôt sur les zones d’hivernage. Au Nord, les ICA sont remarquables. Il faut aussi noter que les régions du SUD n’ont pas eu de deuxième migration fin décembre du fait d’un hiver très doux.

## Evolution ICA par période sur les principales zones BDF



## Une remarque

Comme depuis 8 ans, nous constatons que le stock d'oiseaux disponible sur le pays arrive à son maximum début décembre et qu'ensuite les qualités des ICA régionaux dépendent fortement de la météo.

## En conclusion

Nous tenons particulièrement à remercier tous les chasseurs qui nous alimentent en informations. Les données sont cumulées avec les données France en fin de saison la commission technique BDF publie le mémoire BDF qui va enrichir les données FNC sur la bécasse.

C'est à vous de faire en sorte de protéger votre et notre passion. Effectivement, la connaissance des populations de bécasses est un élément fondamental de la gestion de cette chasse et de sa pérennité. Donner des éléments tangibles précis en cours de saison et en fin de saison permet de remonter des informations statistiques bien plus performantes qu'une impression de terrain et qui permettent de répondre sur le fond à nos détracteurs.

Pascal Repiton

Responsable de la commission technique BDF  
Association des bécassiers de l'Isère.

