

FLASH INFO n°3 - Saison 2012/2013

1^{er} Octobre - 10 décembre

Grand froid sur le nord de l'Europe : accentuation des arrivées


La carte NOAA des anomalies de températures pour cette première décade de décembre est explicite : très forte pression du froid en Finlande et Scandinavie avec des températures entre 6 et 12°C en dessous des normales !

Les régions d'Europe centrale ont aussi connu des températures déjà très hivernales d'environ 3°C en dessous des normales.

Cette pression du froid a contribué à ce que les bécasses voyagent vers les terminus migratoires, au moins pour les oiseaux du flux fenno-scandinave.

Le début de cette période a été marqué en France par quelques jours de gel assez vif notamment sur l'Est du pays. Cependant, douceur et précipitations sont revenues en force dans la majorité des régions. Ces conditions météorologiques accentuent significativement les capacités d'accueil des remises hivernales des bécasses : forêts, boisements, bocage, prairies et cultures offrent de bonnes potentialités en nourriture et sont donc très attractifs après le long voyage migratoire.

Carte du 1 au 10 décembre 2012



Anomalies de températures en Europe

Comparaison réalisée par rapport à la période 1981-2010 (bleu à violet : écarts négatifs de 2 à 12°C; vert à rouge : écarts positifs de 2 à 12°C)

Effectifs stables ou en progression sauf dans le Sud-ouest

Durant cette première décade de décembre, les Indices d'Abondance Nocturne pour les régions proches de la Manche sont restés très élevés en Pas-de-Calais-Picardie (8,3) en Haute et Basse Normandie (8,4) et en Bretagne (5).


Sur la frange atlantique, alors que l'IAN progresse en Pays-de-la-Loire, celui-ci faiblit légèrement pour les régions Poitou-Charentes et Aquitaine (4,2 et 3,6).

Les migratrices observées lors de la dernière décade de novembre ont-elles prolongé en partie leurs déplacements de l'autre côté des Pyrénées ? D'après les correspondants au Pays Basque espagnol (David Acheritogaray, com. pers.), peu d'arrivées significatives sont relevées fin novembre-début décembre cependant les oiseaux ont pu se disperser à une plus vaste échelle jusqu'au Portugal. Une chose semble acquise à mi-saison, le grand Sud-ouest connaît un déficit en oiseaux.

Les régions de l'Est et notamment Bourgogne-Franche-Comté et Centre-Ile-de-France conservent un IAN fort, supérieur à 4,5. Pour Rhône-Alpes et Massif Central, malgré une alerte au froid dans les premiers jours de décembre, les bécasses sont encore au rendez-vous lors des opérations de baguage nocturne.

Dans la frange méditerranéenne, la région PACA enregistre une augmentation de l'IAN (de 4 à 4,7) contrairement au Languedoc-Roussillon qui a faibli (2,2).


IAN Période du 1 décembre au 10 décembre 2012



IAN élevé, en légère progression



Le nombre de contacts par heure pour cette première décade de décembre s'élève à 4,5 soit une légère hausse par rapport à celui de fin novembre (4,3). Cette valeur demeure néanmoins au-dessus de la moyenne des neuf saisons précédentes.

Au total, 463 fichiers nous ont été transmis dans la première partie de cette saison. Ces données représentent 1923 heures de prospection (2340 heures à la même période en 2011-2012).



Un âge-ratio dans la moyenne

Avec une valeur de 61% dans la dernière décade de décembre, la proportion de jeunes bécasses rejoint la valeur moyenne des saisons 2003 à 2012. Comme en 2011 à cette période, de nombreuses bécasses adultes ont réintégré leurs remises hivernales, ce qui fait donc évoluer l'âge-ratio.




Bilan provisoire en demi-teinte

A mi-saison, le bilan provisoire est en demi-teinte avec une répartition hétérogène des bécasses. En effet, si certaines régions semblent avoir bénéficié d'arrivées très importantes de migratrices, c'est le cas du Nord et du Nord-ouest de la France, d'autres grandes régions françaises demeurent dans l'expectative notamment dans le Sud-ouest et le Sud-est. Nos constatations sont confirmées par les relevés des chasseurs du Club National des Bécassiers (données de « Béc@notes ») et aussi par Bécassiers de France (Patrick Courget, com. pers.).

Les oiseaux du flux fenno-scandinave ont été vigoureusement bousculés vers les grandes zones d'hivernage britanniques et françaises, par contre il se confirme une certaine absence des bécasses du flux est-européen.

A l'approche de l'arrivée officielle de l'hiver et alors que la nappe d'air très froid venue de Sibérie enveloppe l'ensemble de l'Europe du Nord et de l'Est, vos observations lors des prochaines sorties baguage permettront de compléter d'une nouvelle pièce le puzzle de cette saison 2012-2013 qui nous réserve peut-être encore des surprises.

Bonne fin d'année à tous !



© JS Guittou

Le protocole « gel prolongé », rappel aux interlocuteurs techniques et observateurs

Les dates des comptages en routine sur les sites de référence doivent se situer au plus près des dates suivantes
7-8 décembre, 22-23 décembre, 7-8 janvier, 22-23 janvier, 7-8 février